

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	リアッププラス
2	成分・分量	100mL 中 ミノキシジル 1.0g パントテニールエチルエーテル 1.0g トコフェロール酢酸エステル 0.08g l-メントール 0.3g
3	用法・用量	成人男性（20歳以上）が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布する。
4	効能・効果	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は使用しないでください <ol style="list-style-type: none"> (1) 未成年者（20歳未満）。 (2) 壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。 (3) 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。 (4) 女性。 2. 次の部位には使用しないでください <ol style="list-style-type: none"> (1) 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。 (2) きず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある頭皮。 3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤（軟膏、液剤等）の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。 4. 次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> ・家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。 ・今までに薬や化粧品によるアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。 ・高齢者（65歳以上）。 ・高血圧の人、低血圧の人。 ・心臓又は腎臓に障害のある人。 ・甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）の診断を受けている人。 ・むくみのある人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談ください。



包装	60mL
----	------

〈商品特長〉

- ◆リアッププラスは、有効成分としてミノキシジルに、パントテニールエチルエーテル、トコフェロール酢酸エステル、*l*-メントールをプラスした男性用の発毛剤です。
- ◆ミノキシジルが毛包に直接作用して、発毛、育毛効果を発揮するとともに、その他の成分が頭皮の環境をととのえ、清涼感をあたえます。