

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	リアップ®ジェット
2	成分・分量	薬液 100mL 中 ミノキシジル 1.0g パントテニールエチルエーテル 1.0g トコフェロール酢酸エステル 0.08g l-メントール 0.3g
3	用法・用量	成人男性（20歳以上）が、1日2回、1回薬液1mL（15噴射）を脱毛している頭皮に噴射する。
4	効能・効果	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は使用しないでください。 <ol style="list-style-type: none"> 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 女性。 未成年者（20歳未満）。 壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。 次の部位には使用しないでください。 <ol style="list-style-type: none"> 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。 きず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある頭皮。 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤（軟膏、液剤等）の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。 次に該当する人はお申し出ください。 <ul style="list-style-type: none"> 今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。 高血圧の人、低血圧の人。 心臓又は腎臓に障害のある人。 むくみのある人。 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。 高齢者（65歳以上）。 甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）の診断を受けている人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

[注意事項]

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用后、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談ください。



包装	100mL
----	-------

〈商品特長〉

- ◆リアップジェットは、発毛成分ミノキシジルを配合した心地よい使用感のジェット噴射式エアゾールです。
- ◆頭皮に直接押しあてて15噴射することにより、1回使用量を手軽に塗布できる定量噴射容器を採用しました。
- ◆ミノキシジルが毛包に直接作用して、発毛、育毛効果を発揮するとともに、その他の成分が頭皮の環境をととのえ、清涼感をあたえます。